

Abstrak.

Yusuf, Ibrahim. 2014. **Perbedaan Tingkat Kecemasan Mahasiswa Kedokteran FKUB Yang Sedang Menjalani Kepaniteraan Senior (Ko-asisten) Di Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Dan Bedah FKUB**, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pembimbing : (1) dr. Nanik Setijowati.M.Kes. (2) dr. Roekani Hadiseputro Sp.KJ(K).

Frekuensi gejala kecemasan cukup tinggi pada mahasiswa kedokteran. Namun masih belum diketahui pada fase mana kecemasan mahasiswa menjadi paling tinggi. Oleh karena itu, perlu diketahui kecemasan Ko-asisten pada pelayanan kesehatan primer (IKM) dibandingkan dengan koas Bedah. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Data dikumpulkan dari 60 mahasiswa Ko-asisten Bedah di rumah sakit rujukan dan Ko-asisten IKM di Pelayanan Primer menggunakan variabel independent mahasiswa stase Ko-ass(IKM dan Bedah) dan variabel dependent tingkat kecemasan dengan porpositive sampling dan diuji dengan HARS. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor HARS pada kelompok Ko-asisten Bedah adalah 40.03 yang menunjukkan kecemasan berat dan kelompok Ko-asisten yang sedang menjalani stase Ko-asisten IKM adalah 13.00 yang menunjukkan kecemasan ringan dengan ($p=0.000$, $p<0.05$). Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan kecemasan yang bermakna antara kecemasan Ko-asisten Rumah Sakit (stase bedah) dan Ko-asisten Pelayanan Primer (stase IKM)

Kata kunci: HARS(Hamilton Anxiety Rating Scale), kecemasan, ko-asisten, mahasiswa kedokteran, IKM, Bedah

Abstract.

Yusuf, Ibrahim.2014. **The Different In The Level Of Anxiety Medical Student FKUB Who Undergoing FKUB Clerkship (Ko-asisten) In Primary Health Service and surgery FKUB.** Final Assignment, Medical Program, Faculty Of Medicine, Brawijaya University. Supervisors : (1) dr. Nanik Setijowati.M.kes (2) dr. Roekani Hadiseputro.Sp.KJ(K).

The frequency of anxiety symptoms in medical students is quite high. However, it is still unclear at which phase the students anxiety reach the highest. Hence, it is needed to find out Ko-asisten's anxiety level at Primary Health Service (IKM) compared to surgery koas. This research is analytic observational research with cross sectional study. The Data is collected from 60 surgery Ko-asisten students at referral hospital and IKM Ko-asisten at Primary Service using variable independent stase Ko-asisten student(Primary Health Service and Surgery) and variable dependent anxiety step with purposive sampling and than tested with HARS. The outcome of this research shows HARS average score at Group of surgery Koas is 40.03 ± 37.41 that indicates severe anxiety and Group of Ko-asisten who is doing Ko-asisten IKM stase is 13.00 ± 3.129 that indicates light anxiety with ($p=0.000$, $p<0.05$). It shows that there is signitificans anxiety difference between Hospital Ko-asisten (surgery stase) and Primary Service Ko-asisten (IKM stase).

Keyword : HARS(Hamilton Anxiety Rating Scale), anxiety, Ko-asisten, student faculty,PH(Public Health), Surgery

