

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Tidak terdapat perbedaan *self treatment* antara laki-laki dan perempuan terhadap tanda dan gejala Infark Miokard Akut (IMA) di RSUD Dr. Saiful Anwar.
2. *Self treatment* terhadap tanda dan gejala IMA pada pasien laki-laki di RSUD dr. Saiful Anwar Malang sebesar 11,4% responden melakukan *self treatment* farmakologi saja dan 82,9% responden melakukan *self treatment* nonfarmakologi saja, serta yang melakukan *self treatment* keduanya sebesar 5,7%.
3. *Self treatment* terhadap tanda dan gejala IMA pada pasien perempuan di RSUD dr. Saiful Anwar Malang sebesar 20,0% responden melakukan *self treatment* farmakologi dan 80,0% responden melakukan *self treatment* nonfarmakologi.

7.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbedaan *self treatment* antara laki-laki dan perempuan di Rumah Sakit khusus jantung agar jumlah responden lebih banyak dan bisa mengetahui secara pasti perbedaannya. Dengan menambahkan kriteria eksklusi seperti usia, riwayat diabetes dan riwayat jantung agar faktor perancu dapat diminimalkan.

