



BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep



Keterangan :



= diteliti



= tidak diteliti



Secara garis besar gizi buruk disebabkan oleh karena asupan makanan yang kurang atau anak sering sakit, atau terkena infeksi. Asupan makanan yang kurang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tidak tersedianya makanan secara adekuat, anak tidak cukup mendapat makanan yang bergizi, dan pola makan yang salah. Dalam proses penatalaksanaan KEP terdapat 4 fase, adalah fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi dan fase tindak lanjut. Pada fase stabilisasi, fase transisi dan fase rehabilitasi dilaksanakan rawat inap di Rumah Sakit dengan pemberian nutrisi formula enteral *hospital made/homemade*, sedangkan pada fase lanjutan dapat dilaksanakan di rumah dengan pemberian formula makanan baik secara *homemade/hospital made* maupun membeli produk komersial. Produk enteral komersial membutuhkan perhatian khusus dalam hal penyeduhannya yaitu faktor suhu seduh untuk mengurangi terjadinya kehilangan terlalu banyak protein. Untuk mengetahui seberapa banyak protein yang hilang maka akan dilakukan uji kadar protein.

3.2 Hipotesis Penelitian

Terdapat pengaruh suhu penyeduhan terhadap kandungan protein formula enteral komersial.