


3.1 Kerangka Konsep



Keterangan:

 : Diteliti

 : Tidak diteliti

3.1.1 Deskripsi Kerangka Konsep

Faktor yang menyebabkan asfiksia neonatorum antara lain faktor keadaan ibu, faktor keadaan bayi, faktor plasenta dan faktor persalinan. Faktor keadaan ibu meliputi hipertensi pada kehamilan (preeklampsia dan eklampsia), perdarahan antepartum (plasenta previa, solusio plasenta), anemia dan Kekurangan Energi Kronis (KEK), infeksi berat, dan kehamilan postdate. Faktor keadaan bayi meliputi prematuritas, BBLR, kelainan kongenital, ketuban bercampur mekonium. Faktor plasenta meliputi, lilitan tali pusat, tali pusat pendek, simpul tali pusat, prolapsus tali pusat. Faktor neonatus meliputi depresi pernafasan karena obat-obat anestesi atau analgetika yang diberikan pada ibu, dan trauma. persalinan, misalnya perdarahan intrakranial. Faktor persalinan meliputi partus lama atau macet, persalinan dengan penyulit (letak sungsang, kembar, distosia bahu, vakum ekstraksi, forseps), dan Ketuban Pecah Kini (KPD).

3.2 Hipotesis

H₁: Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara preeklampsia dengan kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Kanjuruhan Kapanjen Malang Periode Januari – Desember 2013.

