

BAB 7 PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tingkat nyeri pada anak usia sekolah dasar saat dilakukan imunisasi pada kelompok intervensi dengan menggunakan media kaleidoskop rata-rata adalah 0,83.
2. Tingkat nyeri pada anak usia sekolah dasar saat dilakukan imunisasi pada kelompok kontrol rata-rata adalah 2,12.
3. Penggunaan media kaleidoskop berpengaruh dan dapat menurunkan tingkat nyeri pada anak usia sekolah dasar saat dilakukan imunisasi

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Pelayanan Kesehatan

Dalam pemberian layanan kesehatan, khususnya pemberian tindakan keperawatan perlu adanya manajemen nyeri untuk memberikan kenyamanan bagi klien. Pemberian distraksi dengan media kaleidoskop sebagai manajemen nyeri non-farmakologi dapat disosialisasikan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi profesi keperawatan dalam pemberian kenyamanan klien. Hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan bacaan tentang manajemen nyeri dalam memberikan asuhan keperawatan bagi klien.

3. Bagi Penelitian

Peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan dengan jumlah responden yang lebih besar dan menggunakan tenaga kesehatan yang sama pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.

