

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Total hasil tangkapan keseluruhan sebanyak 15.420gram. Dari hasil tangkapan dalam hitungan presentase didapatkan hasil tangkapan terbanyak pertama adalah *Cheraxquadricarinatus* (Red Claw) sebesar 59 % atau 9.080gram, dan *Cherax sp* (black thunder) sebesar 41 % atau 6340 gram.
2. Hasil penelitian pada perhitungan hasil tangkapan bubu dari lokasi yang dekat dari keramba jaring apung (KJA) di dapatkan nilai Zhitung sebesar 29,58 dan nilai Ztabel di peroleh nilai sebesar 1,96. Pada hasil perhitungan dari lokasi yang jauh dari keramba jaring apung (KJA) di dapatkan nilai Zhitung sebesar 27,69 dan nilai Ztabel di peroleh nilai sebesar 1,96. Dari kedua lokasi tersebut dapat di simpulkan bahwa di perairan danau toba terdapat hasil tangkapan yang berbeda dari kedua spesies hasil tangkapan baik dari lokasi yang dekat dengan KJA maupun lokasi yang jauh dari KJA.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan umpan yang di gunakan pada alat tangkap bubu. Sehingga dapat diketahuiperbandingan hasil tangkapan dan jenis spesies lainnya yang menjadi target tangkapan.

2. Perlu adanya kebijakan pemerintah setempat tentang penggunaan alat tangkap bubu di perairan danau toba, karena tidak adanya ijin tentang penangkapan

