

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat kecenderungan pasien dengan kadar serum albumin normal memiliki keluaran yang lebih baik daripada pasien dengan hipoalbuminemia.
2. Kadar serum albumin normal berpengaruh terhadap perbaikan pasien stroke trombosis akut, dimana pasien dengan kadar serum albumin normal memiliki perbaikan yang lebih baik daripada pasien dengan hipoalbuminemia.

7.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kadar serum albumin terhadap keluaran pasien stroke trombosis akut dengan jumlah sampel yang lebih besar dan tidak hanya menggunakan pengukuran NIHSS.
2. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kadar serum albumin terhadap perbaikan pasien stroke trombosis akut dengan jumlah sampel yang lebih besar dan tidak hanya menggunakan pengukuran NIHSS.
3. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kadar ureum dan kreatinin terhadap kadar serum albumin, keluaran, dan perbaikan pasien stroke trombosis akut.

