

## BAB VII

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

1. Responden dengan tingkat kepatuhan patuh, persentase terjadinya kejadian *phlebitis* sebesar 2.8% atau sebanyak 1 responden dan yang tidak terjadi 47.2% atau sebanyak 17 responden, sedangkan pada responden dengan tingkat kepatuhan tidak patuh persentase kejadian *phlebitis* yaitu sebesar 16.7% atau sebanyak 6 responden yang tidak terjadi 33.3% atau sebanyak 12 responden.
2. Dari penelitian yang dilakukan pada 36 responden terhadap tingkat kepatuhan perawat dalam penggunaan *standar operasional prosedur* pemasangan infus didapatkan sebanyak 18 orang patuh terhadap SOP pemasangan infus dan yang tidak patuh sebanyak 18 orang
3. Terdapat hubungan tingkat kepatuhan perawat dalam penggunaan *standar operasional prosedur* pemasangan infus terhadap kejadian *phlebitis* yang dilakukan di lakukan di RSUD Sumbawa, dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan maka kejadian *phlebitis* akan semakin rendah. Hal ini mengacu pada *P-value* lebih kecil daripada  $\alpha$  (0.05). sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan maka kejadian *phlebitis* akan semakin rendah.

## 7.2 Saran

1. Bagi petugas kesehatan
  - a. Petugas kesehatan diharapkan selalu menerapkan SOP dalam pemasangan infus sehingga hal tersebut dapat mengurangi terjadinya *phlebitis* dengan meningkatkan kesadaran terhadap risiko dari tindakan yang kita lakukan, dan meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan serta manfaat dari SOP.
  - b. Petugas kesehatan juga harus selalu memperbaharui SOP sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan yang ada yaitu mengadopsi SOP baru, memberikan pelatihan bagi petugas kesehatan terutama perawat untuk penambahan pengetahuan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Penelitian ini menggunakan rancangan studi *cross sectional* sehingga penelitian ini hanya dilakukan satu kali pada observasi dan tidak bisa melihat kejadian yang telah berlangsung sebelumnya, oleh karena itu untuk memperkuat validitas data maka metode penelitian sebaiknya menggunakan *case control* ataupun *cohort*.
  - b. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan menambah faktor-faktor di luar penelitian ini seperti faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan selain dari faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama kerja, yaitu akomodasi, modifikasi faktor lingkungan dan sosial, perubahan model terapi, meningkatkan interaksi profesional kesehatan dengan klien, dukungan, dan komunikasi terapeutik.