

## BAB 7

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap analisis efektivitas biaya antara pasien demam tifoid yang menggunakan antibiotika sefotaksim dengan pasien demam tifoid yang menggunakan antibiotika seftriakson yang dirawat di RSUD Lawang pada periode Maret-Mei 2014 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan total biaya medis langsung Seftriakson mempunyai biaya total yang lebih rendah dibandingkan dengan sefotaksim pada pengobatan pasien demam tifoid.
- b. Berdasarkan perhitungan menggunakan ACER (*average cost effectiveness ratio*) sefotaksim memiliki biaya satuan yang lebih rendah dibandingkan seftriakson
- c. Berdasarkan uji t-independent dan *Mann-Whitney* tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya pasien demam tifoid yang menggunakan sefotaksim dan pasien yang menggunakan seftriakson

#### 7.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti biaya yang dikeluarkan oleh pasien demam tifoid terhadap biaya nonmedis langsung dan biaya tidak langsung serta menambah jumlah sampel, sehingga diperoleh perbedaan komponen biaya yang dikeluarkan

pasien dan pada akhirnya dapat diketahui obat yang mempunyai efektivitas biaya lebih baik antara sefotaksim dan seftriakson pada pengobatan demam tifoid.

