

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada responden *drop out* dan tidak *drop out* Tuberkulosis di Puskesmas kota Malang, maka peneliti menyimpulkan beberapa yaitu:

1. Persepsi keparahan penyakit kelompok *drop out* diperoleh 15 orang (18,28%) mempunyai persepsi keparahan penyakit baik, dan 3 orang (3,65%) mempunyai persepsi keparahan penyakit buruk. Sedangkan kelompok tidak *drop out* diketahui 64 orang (96,32%) mempunyai persepsi keparahan penyakit baik.
2. Hasil penelitian Hubungan persepsi keparahan penyakit dengan menggunakan uji analisis *Chi square* (95%) didapatkan hasil *p value* = 0,001 (<0,05) artinya terdapat hubungan antara persepsi keparahan penyakit dengan kejadian *drop out* pada penderita Tuberkulosis di Kota Malang.
3. Hasil penelitian Hubungan persepsi keparahan penyakit dengan menggunakan uji analisis *Chi square* (95%) terdapat perbedaan antara persepsi keparahan penyakit pada kelompok *drop out* dan tidak *drop out* pada penderita Tuberkulosis di Kota Malang. Dimana pada kelompok (responden) yang mempunyai persepsi keparahan penyakit buruk lebih berisiko untuk *drop out* dibandingkan dengan responden yang mempunyai persepsi keparahan penyakit baik

7.2 Saran

7.2.1 Bagi Profesi Keperawatan

Melihat adanya perbedaan persepsi keparahan penyakit pada penderita yang *drop out* dan tidak *drop out* Tuberkulosis, maka perawat sebagai edukator perlu menekankan pentingnya menjalani pengobatan secara teratur, terutama pada penderita *drop out* Tuberkulosis. Hal tersebut meliputi pemahaman tentang penyakit tuberkulosis dan lamanya pengobatan yang berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada individu ketika tidak melakukan pengobatan secara teratur. Ketika penderita mengetahui dampak putus obat, maka diharapkan penderita akan lebih mengerti bagaimana harus bersikap, yaitu menjalani pengobatan secara teratur hingga waktu yang ditentukan. Perawat dapat memberikan motivasi kepada penderita Tuberkulosis baik yang mengalami *drop out* ataupun yang tidak *drop out* supaya penderita Tuberkulosis semangat untuk menjalani pengobatan

7.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya mengenai variabel yang sama diharapkan dapat meneliti lebih spesifik mengenai sumber informasi yang didapatkan oleh responden. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi keparahan penyakit pada penderita tuberkulosis dapat dilakukan kontrol dengan seksama sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan pada hasil penelitian selanjutnya.