

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Presentase pasien stroke iskemik fase akut dengan status gizi kurang, normal, dan lebih masing-masing sebesar 33,33%
2. Pada kelompok status gizi kurang, normal, dan lebih memiliki persentase luaran klinis baik yang lebih banyak daripada persentase luaran klinis yang buruk.
3. Tidak terdapat perbedaan tingkat status gizi (normal, kurang, dan lebih) dengan luaran klinis pasien stroke iskemik fase akut.

7.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut perbedaan tingkat status gizi dengan luaran klinis pasien stroke iskemik fase akut dengan mengobservasi pasien secara langsung, sampel yang besar, dan mengikuti perkembangan penyakit pasien.
2. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang perbedaan tingkat status gizi dengan luaran klinis pasien stroke iskemik akut dengan menggunakan penilaian status gizi secara antropometri, hematologi, dan biokimia. Selain itu skala untuk melihat luaran klinis tidak hanya berdasarkan nilai NIHSS awal perawatan dan akhir perawatan tetapi juga dibandingkan dengan menggunakan skala penilaian yang lain, yaitu skala index Barthel dan *skala modified ranking scale (mRS)*.