

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengukuran menggunakan Algoritma Naranjo, potensi efek samping yang muncul adalah Metformin berpotensi menimbulkan efek samping timbulnya mual (*Definite*), Glibenklamid berpotensi menimbulkan efek samping hipoglikemia (*Definite*), Glimepiride efek samping potensial adalah munculnya mual (*Definite*).
2. Persentase timbulnya efek samping mual pada Metformin adalah 18,52% dan pada penggunaan Glimepiride 13,33%. Persentase timbulnya efek samping hipoglikemia pada penggunaan Glibenklamid yaitu 15,79%. Untuk penggunaan Insulin Aspart dan Detemir tidak ditemukan adanya kejadian efek samping.

7.2. Saran

1. Perlu adanya waktu khusus untuk mewawancarai pasien dalam proses pengambilan data. Semakin banyak waktu wawancara dengan pasien maka data yang didapatkan pun semakin lengkap dan semakin sesuai dengan kondisi pasien karena pasien akan memaparkan secara lengkap setiap informasi yang kita butuhkan.
2. Apabila terdapat pihak yang ingin mengembangkan penelitian ini sebaiknya pengambilan data dilakukan secara sekuensial pada tiap kunjungan pasien.
3. Kejadian efek samping dapat diminimalkan dengan pemilihan obat yang prevalensi kejadian efek sampingnya kecil.