

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pengaruh pemberian ekstrak daun kemiri terhadap penurunan kadar MDA serum tikus Wistar model DM tipe 2 sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian ekstrak daun kemiri dengan dosis 100mg/kgBB/hari, dosis 200mg/kgBB/hari maupun dosis 400mg/kgBB/hari dapat menurunkan rata-rata kadar MDA serum tikus Wistar model DM tipe 2 secara bermakna ($p=0,000$).
2. Ada hubungan antara pemberian ekstrak daun kemiri terhadap kadar MDA tikus dengan korelasi negatif yang bermakna penambahan dosis ekstrak daun kemiri akan semakin menurunkan kadar MDA serum tikus ($r=-0,724$, $p=0,000$).

7.2 Saran

1. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis yang paling efektif untuk menurunkan kadar MDA serum.

2. Dilakukan pengukuran bahan aktif 2-O-rhamnosilswertisin dan swertisin sebelum memberikan ekstrak kepada hewan coba, untuk menguji efektifitas proses ekstraksi.
3. Dilakukan penelitian mengenai efek samping dan toksisitas ekstrak daun kemiri apabila digunakan pada manusia.

