

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Terdapat 10 anak (27.8%) memiliki kebiasaan menghisap jempol. Dalam sehari, frekuensi anak-anak melakukan kebiasaan tersebut tergolong dalam kriteria sedang dengan durasi rata-rata kurang dari satu jam.
2. Terdapat 16 anak (44.4%) memiliki kebiasaan menjilat bibir. Dalam sehari, frekuensi anak-anak melakukan kebiasaan tersebut tergolong dalam kriteria sedang dengan durasi rata-rata kurang dari satu jam.
3. Terdapat 10 anak (27.8%) memiliki kebiasaan menghisap jempol dan menjilat bibir. Dalam sehari, frekuensi anak-anak melakukan kebiasaan tersebut tergolong dalam kriteria sedang dengan durasi rata-rata kurang dari satu jam.
4. Terdapat hubungan positif antara kebiasaan menghisap jempol dengan *angular cheilitis* pada anak usia 6-12 tahun di Kota Malang.
5. Terdapat hubungan positif antara kebiasaan menjilat bibir dengan *angular cheilitis* pada anak usia 6-12 tahun di Kota Malang.
6. Terdapat hubungan positif antara kebiasaan menghisap jempol dan menjilat bibir dengan *angular cheilitis* pada anak usia 6-12 tahun di Kota Malang.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden, memperluas wilayah penelitian, meneliti hubungan kebiasaan buruk bernafas melalui mulut

terhadap resiko terjadinya *angular cheilitis*, dan meneliti hubungan kehilangan dimensi vertikal oklusi terhadap terjadinya *angular cheilitis*.

