

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat korelasi sangat lemah antara jumlah leukosit dengan luaran pasien stroke trombotik dalam 24 jam onset yang dinilai dengan skor NIHSS.
2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah leukosit dengan luaran pasien stroke trombotik.

7.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian multisenter perlu dilakukan untuk mengetahui korelasi jumlah leukosit dengan luaran pasien stroke trombotik dinilai dengan skor NIHSS, sehingga bisa melibatkan jumlah sampel yang banyak dan tidak terbatas pada RS. Saiful Anwar saja.
2. Proses pengambilan leukosit harus dilakukan secara serial sesuai dengan patofisiologi infiltrasi leukosit yang dimulai pada 6 jam pertama paska onset stroke.
3. Perlu dilakukan anamnesis yang tepat untuk mengetahui riwayat infeksi yang terdapat pada pasien yang mendahului onset stroke.

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan IL-6 dengan luaran pasien stroke trombotik dalam 24 jam onset dinilai dengan skor NIHSS.